

Prénom :

Date :

À la maison (1)

S'informer sur divers risques domestiques



Prudence à la maison...

- a. Le tableau ci-dessous indique, pour 100 accidents domestiques, la fréquence des blessures et lésions en fonction de l'âge des victimes. Observe le tableau puis **réponds aux questions posées**.

Lésion \ Âge	de 0 à 1 an	de 2 à 3 ans	de 4 à 9 ans	de 10 à 16 ans
hématome	50	27	26	11
plaie superficielle	21	26	26	19
plaie profonde	10	19	23	17
entorse / luxation	2	4	5	16
fracture	4	3	8	20
traumatisme crânien	6	1	1	-
autre traumatisme	-	3	3	6
brûlure superficielle	10	10	5	8
brûlure profonde	2	6	1	4
intoxication	2	5	3	3
asphyxie	-	1	0,5	0,7
autre	4	5	6	1

(Sources : CNAM, *Les Accidents de la vie courante*.)

1. Quelle est la lésion la plus fréquente chez les enfants de 0 à 1 an ?

Comment peut-on l'expliquer ?



2. Quelles sont les tranches d'âge les plus exposées aux brûlures superficielles ?

- b. Relie chaque élément dangereux à la précaution qu'il faut prendre.

- | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|
| sol glissant | • | • | rambarde, barrière de sécurité |
| escalier ou mezzanine | • | • | placard bien fermé |
| matériel de bricolage | • | • | porte isolante |
| prise de courant | • | • | pare-feu |
| cheminée | • | • | tapis antidérapant |
| four | • | • | cache-prise |

S'entraîner


Prénom :

Date :

À la maison (1)

S'informer sur divers risques domestiques

Note :



Prudence à la maison...

- a. Le tableau ci-dessous indique, pour 100 accidents domestiques, la fréquence des blessures et lésions en fonction de l'âge des victimes. Observe le tableau puis **réponds aux questions posées**.

Lésion \ Âge	de 0 à 1 an	de 2 à 3 ans	de 4 à 9 ans	de 10 à 16 ans
hématome	50	27	26	11
plaie superficielle	21	26	26	19
plaie profonde	10	19	23	17
entorse / luxation	2	4	5	16
fracture	4	3	8	20
traumatisme crânien	6	1	1	-
autre traumatisme	-	3	3	6
brûlure superficielle	10	10	5	8
brûlure profonde	2	6	1	4
intoxication	2	5	3	3
asphyxie	-	1	0,5	0,7
autre	4	5	6	1

(Sources : CNAM, *Les Accidents de la vie courante*.)

1. Quelle est la lésion la plus fréquente chez les enfants de 0 à 1 an ?

C'est l'hématome.

Comment peut-on l'expliquer ?

Les enfants de moins d'un an tombent souvent et se cognent car ils n'ont pas encore un bon équilibre.


2. Quelles sont les tranches d'âge les plus exposées aux brûlures superficielles ?

Ce sont les enfants de 0 à 1 an et de 2 à 3 ans.



- b. Relie chaque élément dangereux à la précaution qu'il faut prendre.

sol glissant
escalier ou mezzanine
matériel de bricolage
prise de courant
cheminée
four



rambarde, barrière de sécurité
placard bien fermé
porte isolante
pare-feu
tapis antidérapant
cache-prise

Se corriger